

# Lemocin® Lutschtabletten

## Kurztext

### Lemocin® Lutschtabletten

Lemocin® Lutschtabletten werden zur Behandlung bei Halsschmerzen und Entzündungen der Mundschleimhaut angewendet.

## Langtext

### Lemocin® Lutschtabletten

Lemocin® Lutschtabletten bieten rasche Hilfe bei Entzündungen des Mund- und Rachenraums. Die Behandlung ist bereits bei den ersten Anzeichen von Halsschmerzen und Schluckbeschwerden zu empfehlen. Die 3-fach Kombination mit Lidocain, Tyrothricin und Cetrimoniumbromid wirkt schmerzstillend, antibakteriell und desinfizierend

### *Indikation*

Lemocin wird zur unterstützenden Behandlung bei leichten bis mittelschweren Entzündungen des Rachenraumes und der Mundhöhle (Halsschmerzen und Entzündungen der Mundschleimhaut) angewendet.

### *Anwendung*

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Je nach Grad der Beschwerden alle 1-3 Stunden 1 Lutschtablette. Eine Tagesdosis von 8 Lutschtabletten ist nicht zu überschreiten. Die niedrigste Dosis, die zur Erzielung der Wirksamkeit erforderlich ist, soll für die kürzeste Behandlungsdauer angewendet werden.

### *Inhaltsstoffe*

1 Lutschtablette enthält: Tyrothricin 4 mg entsprechend Gramicidin 800 I.E., Cetrimoniumbromid 2 mg, Lidocain 1 mg

Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid, Guar, Magnesiumstearat, Saccharin-Natrium, Sorbitol, Talkum, Zitronensäure, Pfefferminz-Aroma, Zitronen-Aroma, Chinolingelb (E 104), Farbstoff Grün

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.